

Bijlage bij gemengde grasbufferstrook

Bijlage bij grasbufferstrook: soortenlijst

Aandacht

Voeg bij de beheersovereenkomst:

- ofwel de factuur en het zaaizaadetiket met vermelding van soorten en hun percentage,
- ofwel de factuur, met op de factuur de vermelding van de soorten en hun percentage.

Gras(kruiden)mengsel	
samenstelling	zaaihoeveelheid
<p>Je stelt het zaadmengsel samen aan de hand van de soortenlijst op de volgende bladzijde. Het resulterend mengsel bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none">- 85 % grassen, minstens drie soorten, waarvan minstens twee soorten aangeduid met *- 15 % kruiden, bestaande uit:<ul style="list-style-type: none">o vlinderbloemigen, minstens een soort en tussen 2% en 5% gewichtsaandeel in het volledige zaadmengselo een- of tweejarige kruiden, minstens twee soorten en tussen 5% en 10% gewichtsaandeel in het volledige zaadmengselo meerjarige kruiden, minstens twee soorten en tussen 5% en 10% gewichtsaandeel in het volledige zaadmengsel	max. 15 kg / ha

groep	Nederlandse benaming	wetenschappelijke benaming	maximaal % op totaal gewicht
Grassen (minstens drie soorten, waarvan minstens twee aangeduid met *, 85% van totaal gewicht)	beemdlangetbloem	<i>festuca pratensis</i>	5
	gestreepte witbol	<i>holcus lanatus</i>	5
	gewoon struisgras*	<i>agrostis tenuis</i>	25
	glanshaver	<i>arrhenatherum elatius</i>	5
	haver	<i>avena sativa</i>	10
	Italiaans raaigras	<i>lolium multiflorum</i>	15
	kropaar	<i>dactylis glomerata</i>	5
	reukgras*	<i>anthoxanthum odoratum</i>	25
	rietzwenkgras	<i>festuca arudinaceae</i>	5
	rood zwenkgras*	<i>festuca rubra</i>	50
	ruw beemdgras*	<i>poa trivialis</i>	25
	timotee	<i>phleum pratense subsp. pratense</i>	5
	veldbeemdgras*	<i>poa pratensis</i>	50
Vlinderbloemigen (minstens 1 soort, min. 2% en max. 5% van totaal gewicht)	gewone rolklaver	<i>lotus corniculatus</i>	2
	luzerne	<i>medicago sativa</i>	2
	rode klaver	<i>trifolium pratense</i>	2
	veldlathyrus	<i>lathyrus pratense</i>	2
	vogelwikke	<i>vicia cracca</i>	2
	hopklaver	<i>medicago lupulina</i>	2
Een- of tweejarige kruiden (minstens 2 soorten, min. 5% en max. 10% van totaal gewicht)	grote klaproos	<i>papaver rhoeas</i>	5
	bleke klaproos	<i>papaver dubium</i>	5
	korenbloem	<i>centaurea cyanus</i>	5
	wilde chicorei	<i>cichorium intybus</i>	5
	wilde peen	<i>daucus carota</i>	5
Meerjarige kruiden (minstens 2 soorten, min. 5% en max. 10% van totaal gewicht)	avondkoekoeksbloem	<i>silene latifolia subsp. alba</i>	5
	duizendblad	<i>achillea millefolium</i>	5
	gewone margriet	<i>leucanthemum vulgare</i>	5
	gewone brunel	<i>prunella vulgaris</i>	5
	gewoon biggenkruid	<i>hypochaeris raidicata</i>	5
	groot Kaasjeskruid	<i>malva sylvestris</i>	5
	groot streepzaad	<i>crepis biennis</i>	5
	kleine pimprnel	<i>sanguisorba minor</i>	5
	knoopkruid	<i>centaurea jacea/thuillieri</i>	5
	muskuskaasjeskruid	<i>malva moschata</i>	5
	smalle weegbree	<i>plantago lanceolata</i>	5
	wilde marjolein	<i>origanum vulgare</i>	5

Tips bij de aanleg

- ✓ Een gemengde grasstrook zaai je best in tijdens de nazomer (voorafgaand aan de start van de beheerovereenkomst), of rond half april.
- ✓ Indien je in het voorjaar inzaait en/of op percelen met een grotere onkruiddruk, werk je bij voorkeur met een vals zaaibed. De strook wordt zaaiklaar gelegd minstens twee weken voor de inzaai van het zaadmengsel. Een oppervlakkige bodembewerking (3 à 4 centimeter diep) haalt aanwezig of kiemend onkruid weg, zonder nieuwe onkruidzaden naar boven te halen. Pas na deze bodembewerking zaai je in.
- ✓ Je zaait zo oppervlakkig mogelijk.
- ✓ Wanneer je grotere oppervlaktes inzaait, moet je het zaadmengsel af en toe roeren zodat de zaden goed gemengd blijven.
- ✓ Wanneer je inzaait in droge omstandigheden of op lichte gronden, rol je de gronden best na het inzaaien? Zo voorkom je dat de oppervlakkig ingezaaide zaden uitdrogen.

